

CONDUITE À TENIR EN CAS DE MANIFESTATIONS ALLERGIQUES À L'ECOLE

Document pouvant servir de complément à la procédure pour les besoins de santé particuliers (PBSP).

Pour tout renseignement, consultez l'infirmière de santé scolaire.

Si un traitement doit être administré, **les médicaments doivent être à portée de main**

NOM de l'élève

ALLERGIE à :

OBSERVER		AGIR	
Réactions simples normales non allergiques			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rougeur à l'endroit de la piqûre d'insecte ◆ enflure à l'endroit de la piqûre d'insecte 		Mettre une poche à glace Eucéta	
Réactions allergiques visibles sur la peau			
heure		heure	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ plusieurs plaques rouges ◆ démangeaisons ◆ enflure localisée (lèvres, paupières) <p>ATTENTION : LA PROGRESSION VERS LE STADE SUIVANT PEUT ÊTRE RAPIDE</p>		L'élève est surveillé et rassuré par un adulte <u>Si prescription médicale :</u> médicament : dose : Tél. : des parents :	
Réactions allergiques générales :			
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Difficultés respiratoires ◆ Enflure du cou et de la face ◆ Voix rauque ◆ Difficulté à avaler (salive, bave) ◆ Lèvres et extrémités bleues ◆ Perte de connaissance 		1. Ne pas laisser l'élève seul 2. Faire l'injection Epipen* (Cf fiche technique Epipen) 3. Tél. : 144 (âge de l'élève, réactions allergiques, mesures prises, état actuel) !en cas de perte de connaissance, mettre en position latérale 4. Avertir la famille : Tél. :	

* vérifier la date de péremption, l'Epipen est valable 12 mois